



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Αχαρνών 2, 10432 Αθήνα, Τηλ. 210-2124331, Fax: 210-2124524

Αθήνα, 30-12-2020
Αριθμ. Πρωτ.: 1427/327641

Προς:
Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων και ΑΚΕ

ΘΕΜΑ: «Το κεδροδάσος της Νάξου καταστρέφεται εξ αιτίας του μύκητα "*Phomopsis juniperovora*"»

ΣΧΕΤ: **1. Η Ερώτηση 1976/13-11-2020**
2. Η Ερώτηση 2019/27-11-2020

Απαντώντας στις παραπάνω Ερωτήσεις που κατέθεσαν οι Βουλευτές **κ. Κ. Βελόπουλος και Φ. Μπακαδήμα**, για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Όσον αφορά στις ξηράνσεις κέδρων (φυτικό είδος: *Juniperus macrocarpa*) που παρατηρούνται στο κεδρο-δάσος της Νάξου (περιοχές Αλυκό και Πυργάκι) σημειώνεται ότι αυτές δεν οφείλονται στον μύκητα "*Phomopsis juniperovora*".

Ειδικότερα, αναφέρεται ότι πραγματοποιήθηκαν επιθεωρήσεις των δέντρων του κεδρο-δάσους από τις υπηρεσίες φυτοϋγειονομικού ελέγχου της περιοχής (ΔΑΟΚ Κυκλάδων – Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Νάξου). Επίσης, η Διεύθυνση Διοίκησης Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το αριθμ. πρωτ. 1082167599/21-9-2020 έγγραφό της ζήτησε τη συνδρομή του Ινστιτούτου Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων (ΙΜΔΟ) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, για τον προσδιορισμό των αιτιών που προκαλούν ξήρανση στα δάση με τους κέδρους στην Π.Ε. Νάξου. Από το Ινστιτούτο εστάλη προσωπικό για επιτόπια εξέταση και λήψη δειγμάτων.

Κάτω από τον φλοιό των δειγμάτων εντοπίστηκαν χαρακτηριστικές διαπλατυσμένες στοές, οι οποίες δημιουργούνται από προνύμφες ξυλοφάγων σκαθαριών καθώς και, προνύμφες και ακμαία ξυλοφάγου κολεόπτερου. Από την εργαστηριακή εξέταση των δειγμάτων, τόσο του ΙΜΔΟ όσο και του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών (ΙΔΕ) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προέκυψε ότι η προσβολή των κέδρων *Juniperus macrocarpa* δεν οφείλεται σε μύκητα, αλλά στο έντομο *Semanotus russicus* (Coleoptera, Cerambycidae). Το ξυλοφάγο αυτό είδος εντόμου, προσβάλλει κωνοφόρα (με εξειδίκευση τα γένη *Juniperus* και *Cedrus*) και αποτελεί μέρος της εντομοπανίδας της Ελλάδας καθώς έχει αναφερθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας. Στον ευρωπαϊκό χώρο ανευρίσκεται στις χώρες της Νοτίου ανατολικής και κεντρικής Ευρώπης καθώς και στη Τουρκία. Συνήθως ξυλοφάγα είδη της οικογένειας Cerambycidae δημιουργούν εκτεταμένες προσβολές όταν οι ξενιστές τους βρίσκονται σε καθεστώς καταπόνησης, καθώς τότε είναι σε θέση να υπερκεράσουν τον αμυντικό μηχανισμό των δέντρων.

Προτάθηκε η άμεση απομάκρυνση των νεκρών και προσβεβλημένων δένδρων πριν την άνοιξη, ώστε να ελεγχθεί ο πληθυσμός του εντόμου. Επίσης, πρόσφατα εξετάστηκαν δείγματα που προέρχονταν από την ευρύτερη περιοχή της Νάξου, εντοπίστηκε η προσβολή από το ξυλοφάγο έντομο *Semanotus russicus* (Coleoptera, Cerambycidae) και δόθηκαν οδηγίες καταπολέμησής του, όπως προκύπτει από σχετικό έγγραφο του ΙΔΕ προς το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Ανάπτυξης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Ειδικότερα, για τον περιορισμό των προβλημάτων που προκαλεί το συγκεκριμένο είδος, συστήνεται:

- α) το επόμενο χρονικό διάστημα (σίγουρα πριν την ερχόμενη άνοιξη) η απομάκρυνση των νεκρών και προσβεβλημένων δέντρων του είδους *Juniperus macrocarpa*, ώστε αφενός να μειωθεί το πληθυσμιακό δυναμικό του εντόμου (που βρίσκεται μέσα στα προσβεβλημένα δέντρα) καθώς και
- β) τοποθέτηση πυκνού δικτύου, ενδεδειγμένων για το είδος, παγίδων εξοπλισμένων με τα κατάλληλα ελκυστικά ώστε να επιτευχθεί η κατά το δυνατόν βιολογική αντιμετώπιση – μείωση του πληθυσμού του ξυλοφάγου εντόμου.

Τέλος, επισημαίνεται ότι δεδομένου ότι το δάσος βρίσκεται δίπλα στην θάλασσα και πέριξ αυτού υπάρχει οικιστική και τουριστική ανάπτυξη δεν μπορεί να γίνει εκτεταμένη χρήση εντομοκτόνων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

- 1.Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γραφ. κ. Υπουργού
- 2.Βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλο
- 3.Βουλευτή κα Φ. Μπακαδήμα