



**Γραφείο Διοίκησης
& Γραμματείας ΔΣ**

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2024

Α.Π.: 14527

**Προς: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
& Τροφίμων
Γραφείο Νομικών και
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων**
Αχαρνών 2, 10432 Αθήνα
Τηλ.: 210-2124331
e-mail.: koinovouleftikos@minagric.gr
ekarli@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην υπ' αριθμ. 3806/15-3-2024 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων»

Σε συνέχεια της ανωτέρω Ερώτησης και κατά το μέρος που αφορά στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, σας γνωρίζουμε ότι από το 2018 στην περιοχή της Βρίας Πιερίας έχει εντοπιστεί ο παθογόνος μύκητας *Gnomoniopsis smithogilvyi* (Gnomoniaceae, Diaporthales, συν. *G. castaneae*), μετά από διαγνωστική εξέταση σε δείγματα κάστανου που στάλθηκαν στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών (ΙΔΕ). Ο συγκεκριμένος μύκητας είχε καταγραφεί από το εν λόγω Εργαστήριο του ΙΔΕ για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2015 στην Πιερία. Το 2020, εκτός από την περιοχή της Πιερίας η ασθένεια καταγράφηκε σε δείγματα από προσβεβλημένα κάστανα που παρουσιάζουν τυπικά συμπτώματα φαιάς σήψης στις περιοχές Καστανερή/Γρίβα Ν. Κιλκίς, Πιαλείας/Ροπωτό Τρικάλων και Μακρακώμη Φθιώτιδας. Το παθογόνο αίτιο της προσβολής ήταν ξανά ο μύκητας *G. smithogilvyi*. Το 2022 η ασθένεια εξαπλώθηκε στη Θεσσαλία και συγκεκριμένα στην περιοχή του Δήμου Αγιάς (Μελιβοία) και στα Αμπελάκια του Δήμου Τεμπών, καθώς επίσης στην Όρμα Πέλλας και στο Κελτεζέ Αρκαδίας ενώ το 2023, ο ίδιος μύκητας καταγράφηκε και στη Μελίκη Ημαθίας.

Ο μύκητας *G. smithogilvyi* προσβάλλει το εσωτερικό του καρπού και καθιστά τους καρπούς μη εμπορεύσιμους, καθώς το κάστανο χάνει τη συνοχή του και εμφανίζει μια σπογγώδη όψη. Το πρόβλημα εντείνεται ακόμη περισσότερο καθώς τα προσβεβλημένα κάστανα δεν μπορούν να εντοπιστούν κατά τη διαλογή.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, το 2020 υποβλήθηκε στο ΥΠΑΤ από το ΙΔΕ, πρόταση για τη χρηματοδότηση ειδικής έρευνας με τίτλο «Φαιά σήψη του κάστανου (*Gnomoniopsis smithogilvyi*): διερεύνηση της αιτιολογίας της βιο-οικολογίας του παθογόνου και των μεθόδων ολοκληρωμένης διαχείρισης της ασθένειας». Η πρόταση εγκρίθηκε και αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα. Το παραπάνω έργο θα περιλαμβάνει: (α) μελέτη της επιδημιολογίας του παθογόνου, η οποία παραμένει άγνωστη για τους επιστήμονες μέχρι σήμερα (β) Πιλοτικές εφαρμογές σκευασμάτων και μεθοδολογιών που βρίσκονται σε στάδιο πειραματισμού. Εν αναμονή της έγκρισης, το ΙΔΕ σε

συνεργασία με τον Δήμο Αγιάς και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μελιβοίας Αγιάς διενήργησε δειγματοληψίες κατά την καλλιεργητική περίοδο του 2023 στην περιοχή της Αγιάς και συνέλλεξε δεδομένα για την ασθένεια και απομονώσεις του μύκητα από την περιοχή.

Με βάση τα αποτελέσματα θα διαμορφωθούν πρακτικές για την αντιμετώπιση του προβλήματος που θα δοθούν στους παραγωγούς με τη μορφή οδηγιών (μέσω ενημερωτικών ημερίδων και εγχειριδίων). Αναφορικά με τη σφήκα της καστανιάς, τα αποτελέσματα από το Μπενάκειο και το ΙΔΕ σχετικά με τη βιολογική καταπολέμηση παρουσιάζονται στον σύνδεσμο

<https://storymaps.arcgis.com/stories/c53de6f347ed44c8a7bd3787e5536ef6>.

Όπως στην υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι και στις περιοχές της Πελοποννήσου πραγματοποιήθηκαν εξαπολύσεις του ωφέλιμου εντόμου *Torymus sinensis*, ενώ σύμφωνα με τους ελέγχους που έγιναν τόσο το 2022 όσο και το 2023, η πορεία του ωφέλιμου είναι ανοδική, κάτι που σημαίνει ότι με τη πάροδο του χρόνου θα γίνει περιορισμός των προβλημάτων που δημιουργεί η σφήκα της καστανιάς.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση.



Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Καθηγητής Σέρκος Α. Χαρουτουιάν