

Γραφείο Διοίκησης &
Γραμματείας ΔΣ

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2026

Α.Π.: 28940

Προς: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
& Τροφίμων
Γραφείο Νομικών και
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων
Αχαρνών 2, 10176 Αθήνα
Τηλ.: 210-2124331
e-mail.: koinonouleftikos@minagric.gr
ekarli@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην υπ' αριθμ. 6822/8-7-2026 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων»

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης και κατά το μέρος που αφορά στη Γενική Δ/ση Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σας γνωρίζουμε ότι η σφήκα της καστανιάς *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu (Hymenoptera: Cynipidae), ένας από τους σημαντικότερους εχθρούς της καστανιάς (*Castanea* spp.) παγκοσμίως, εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα στην περιοχή της Άνω Μηλιάς Πιερίας. Έκτοτε, η εξάπλωσή της σε καστανεώνες και φυσικά καστανοδάση της χώρας υπήρξε ιδιαίτερα ταχεία, γεγονός που οφείλεται τόσο στον παρθενογενετικό τρόπο αναπαραγωγής του είδους, ο οποίος επιτρέπει την εγκατάσταση νέων πληθυσμών ακόμη και από ένα μόνο άτομο, όσο και στη μετακίνηση προσβεβλημένου πολλαπλασιαστικού υλικού μεταξύ περιοχών. Οι προσβολές προκαλούν τον σχηματισμό χαρακτηριστικών κηκίδων σε οφθαλμούς, φύλλα και νεαρούς βλαστούς, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της βλαστικής ανάπτυξης, της ανθοφορίας και της καρποφορίας των δένδρων και κατά συνέπεια, την υποβάθμιση της παραγωγικότητας και της οικονομικής αξίας των καστανεώνων.

Η πλέον αποτελεσματική και διεθνώς αποδεκτή μέθοδος αντιμετώπισης της σφήκας της καστανιάς είναι η κλασική βιολογική καταπολέμηση με την εξαπόλυση του εξειδικευμένου παρασιτοειδούς *Torymus sinensis* Kamijo (Hymenoptera: Torymidae), το οποίο παρασιτεί αποκλειστικά τις κηκίδες του *D. kuriphilus*. Στην Ελλάδα, το εθνικό πρόγραμμα βιολογικής καταπολέμησης υλοποιήθηκε κατά την περίοδο 2018–2023, με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, την Περιφέρεια Ηπείρου και με ίδιους πόρους του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου. Κατά την πρώτη τετραετία εφαρμογής του προγράμματος (2018–2021), το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σε συνεργασία με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, πραγματοποίησε **476 εξαπολύσεις** του παρασιτοειδούς σε **464 θέσεις** που βρίσκονταν σε **25 Περιφερειακές Ενότητες** της ηπειρωτικής Ελλάδας, απελευθερώνοντας συνολικά **95.200 ενήλικα άτομα του *Torymus sinensis***.

Το πρόγραμμα συνεχίστηκε και κατά τα έτη 2022–2023 με νέες εξαπολύσεις και συστηματική παρακολούθηση της εγκατάστασης και της φυσικής διασποράς του παρασιτοειδούς. Τα αποτελέσματα των πολυετών παρακολουθήσεων (όπως προκύπτει από τα στοιχεία που βρίσκονται αναρτημένα στο σχετικό site: <https://storymaps.arcgis.com/stories/c53de6f347ed44c8a7bd3787e5536ef6>) καταδεικνύουν ότι το *T. Sinensis* έχει εγκατασταθεί με επιτυχία στις περισσότερες περιοχές εξαπόλυσης και πλέον ανιχνεύεται και σε περιοχές όπου δεν είχε προηγηθεί ανθρώπινη εισαγωγή, γεγονός που επιβεβαιώνει την ικανότητα φυσικής εξάπλωσης του είδους και δημιουργεί ιδιαίτερα θετικές προοπτικές για τη μακροχρόνια, αυτοσυντηρούμενη βιολογική καταπολέμηση της σφήκας της καστανιάς στην Ελλάδα.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση.



Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καθηγητής Σπυρίδων Α. Μάμαλης