



**ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ
ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ**

Επ. Διεύθυνση: Εντομολογίας & Γεωργικής
Ζωολογίας

Εργαστήριο: Γεωργικής Εντομολογίας

Πληροφορίες: Δρ Δ. Παπαχρήστος,
Δρ Σπ. Αντωνάτος

Κηφισιά, 13/7/2026

Αρ. Πρωτ. 2792

Προς:

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων

Γραφείο Νομικών και

Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

Υπηρεσία Συντονισμού

Αχαρνών 2

Αθήνα 101 76

E-mail: koinovouleftikos@minagric.gr
ekarli@minagric.gr

Θέμα: Ερώτηση αρ. 6822/8.7.2026 της Βουλής των Ελλήνων.

Σχετ.: Ηλεκτρονικό σας μήνυμα από 8.7.2026.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού ηλεκτρονικού σας μηνύματος θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα κάτωθι:

Η παρουσία του εντόμου διαπιστώθηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας το 2014 σε περιοχές της ΠΕ Πιερίας. Η παρουσία του εντόμου προκάλεσε σημαντικές προσβολές στους καστανέωνες, κατάσταση η οποία επιδεινώθηκε κατά τα χρόνια που ακολούθησαν. Η καταπολέμηση της σφήκας της καστανιάς, σύμφωνα με τις αρχές της κλασικής βιολογικής καταπολέμησης, ξεκίνησε στη χώρας μας το 2018. Η υλοποίηση του προγράμματος περιλάμβανε την εξαπόλυση του παρασιτοειδούς εντόμου *Torymus sinensis*. Η παρουσία του εντόμου διαπιστώθηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας το 2014 σε περιοχές της ΠΕ Πιερίας. Η παρουσία του εντόμου προκάλεσε σημαντικές προσβολές στους καστανέωνες, κατάσταση η οποία επιδεινώθηκε κατά τα χρόνια που ακολούθησαν. Η καταπολέμηση της σφήκας της καστανιάς, σύμφωνα με τις αρχές της κλασικής βιολογικής καταπολέμησης, ξεκίνησε στη χώρας μας το 2018. Η υλοποίηση του προγράμματος περιλάμβανε την εξαπόλυση του παρασιτοειδούς εντόμου *Torymus sinensis* καθώς και ετήσιες συστηματικές δειγματοληψίες για τη διαπίστωση της εγκατάστασης και την παρακολούθηση της εξέλιξης των πληθυσμών του ωφέλιμου εντόμου.

Συγκεκριμένα στην ΠΕ Πιερίας, το 2018 πραγματοποιήθηκαν ευρείας κλίμακας εξαπολύσεις που κάλυψαν το σύνολο των περιοχών παρουσίας της καστανιάς. Πραγματοποιήθηκε η εξαπόλυση 42 συσκευασιών του εντόμου (κάθε συσκευασία

περιέχει 200 ενήλικα παρασιτοειδή σε αναλογία 120/80 θηλυκά με αρσενικά) σε 39 θέσεις. Τα επόμενα έτη πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή κάποιες μεμονωμένες συμπληρωματικές εξαπολύσεις και συγκεκριμένα η εξαπόλυση 5 και 2 συσκευασιών το 2019 και 2021 αντίστοιχα. Συνολικά στην περιοχή έγινε η εξαπόλυση 49 συσκευασιών του εντόμου (9.800 ενήλικα παρασιτοειδή έντομα) σε 46 θέσεις.

Η περιοχή παρακολουθούνταν συστηματικά ως προς την εγκατάσταση και την πορεία αύξησης των πληθυσμών του παρασιτοειδούς εντόμου με δειγματοληψίες κηκίδων και προσδιορισμό του ποσοστού παρασιτισμού. Συγκεκριμένα έχουν πραγματοποιηθεί δειγματοληψίες κατά τα έτη 2019, 2020, 2021, 2022 και 2023. Το μέσο ποσοστό παρασιτοειδών εντόμων ανά 100 κηκίδες ήταν 0,5%, 2,0, 6,4, 15,5 και 60,4% για τα έτη 2019, 2020, 2021, 2022 και 2023 αντίστοιχα. Αναλυτικές πληροφορίες για το έντομο και την αντιμετώπισή τους βρίσκονται στο σύνδεσμο <https://storymaps.arcgis.com/stories/c53de6f347ed44c8a7bd3787e5536ef6>.

Από τις δειγματοληψίες για τον έλεγχο της εγκατάστασης του παρασιτοειδούς, του επιπέδου παρασιτισμού και εξέλιξης της πορείας των πληθυσμών του, διαπιστώθηκε, η επιτυχημένη εγκατάστασή του στους καστανέωνες της ΠΕ Πιερίας, η είσοδος των πληθυσμών του στη φάση της ταχείας αύξησης καθώς και η σημαντική μείωση των προσβολών. Δεδομένου του καλού επιπέδου εγκατάστασης αλλά και των υψηλών πληθυσμών που εμφανίζει το παρασιτοειδές οι περεταίρω εξαπολύσεις δεν εισφέρουν ουσιαστικά στην επαύξηση του περιορισμού της σφήκας της καστανιάς. Για την διατήρηση των πληθυσμών του παρασιτοειδούς θα πρέπει να λαμβάνονται όλα εκείνα τα μέτρα που εξασφαλίζουν την προστασία του, όπως είναι η αποφυγή διενέργειας ψεκασμών με ευρέως φάσματος εντομοκτόνα την περίοδο της άνοιξης και η καταστροφή των ξερών κηκίδων (οι οποίες αποτελούν τις θέσεις διαχείμασης του παρασιτοειδούς) κατά την περίοδο του χειμώνα και τις αρχές της άνοιξης. Όπως, μπορεί να συμβεί σε όλες τις περιπτώσεις προγραμμάτων κλασικής βιολογικής καταπολέμησης, έτσι και στην περίπτωση της σφήκας της καστανιάς, μπορούν να παρατηρηθούν μεμονωμένες και σποραδικές χρονικά και τοπικά εξάρσεις των πληθυσμών της σφήκας, όμως σε αυτές τις περιπτώσεις η μείωση των πληθυσμών της σφήκας επιτυγχάνεται με φυσικό τρόπο με τη μετακίνηση παρασιτοειδών από γειτονικούς καστανέωνες. Σε όλες τις περιπτώσεις ενδεδειγμένη τακτική αποτελεί η διενέργεια δειγματοληψιών ώστε να εκτιμάτε πλήρως η κατάσταση και να πραγματοποιούνται οι κατάλληλες παρεμβάσεις.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.

Ο Γενικός Διευθυντής

Δρ Π. Μυλωνάς