



**ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ
ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ**

Επ. Διεύθυνση: Φυτοπαθολογίας
Εργαστήρια: Μυκητολογίας
Πληροφορίες: Δρ Αιμ. Μαρκέλλου,
Δ. Τσιρογιάννης

Κηφισιά, 21.7.2026

Αρ. Πρωτ. 2882

Προς:

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
Γραφείο Νομικών και
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων
Υπηρεσία Συντονισμού
Αχαρνών 2
Αθήνα 104 32

E-mail:

koinovouleftikos@minagric.gr
ekarli@minagric.gr

Θέμα: Ερώτηση αρ. 7064/16.7.2026 της Βουλής των Ελλήνων.

Σχετ.: Ηλεκτρονικό σας μήνυμα από 17.7.2026.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού ηλεκτρονικού σας μηνύματος θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα κάτωθι:

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εργαστηρίου Μυκητολογίας του ΜΦΙ για το έτος 2026, δεν μας έχει αποσταλεί από καμία περιοχή της Χώρας δείγμα αμπέλου με συμπτώματα πιθανής προσβολής από περονόσπορο, συμπεριλαμβανομένης και της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Διευκρινίζουμε ωστόσο ότι τα στοιχεία προέρχονται από δείγματα που αποστέλλονται στο Ινστιτούτο στα πλαίσια της διάγνωσης από Δημόσιες Υπηρεσίες (Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακών Ενοτήτων, Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου του ΥΠΑΑΤ, κλπ), Ομάδες Παραγωγών, Συνεταιρισμούς, Γεωπόνους ελεύθερους επαγγελματίες, παραγωγούς και ιδιώτες. Είναι πιθανόν να έχουν παρουσιασθεί τοπικά προβλήματα από το παθογόνο και να μην έχει σταλθεί δείγμα για διάγνωση στο Ινστιτούτο.

Η ασθένεια της αμπέλου γνωστή ως "περονόσπορος" οφείλεται στο φυτοπαθογόνο ωομύκητα *Plasmopara viticola*. Τα πρώτα συμπτώματα της ασθένειας εμφανίζονται στην πάνω επιφάνεια των φύλλων με τη μορφή γωνιωδών, κιτρινοπράσινων ή ελαιωδών κηλίδων, οι οποίες συνήθως περιορίζονται από τα νεύρα. Σε συνθήκες υψηλής σχετικής υγρασίας, στις αντίστοιχες θέσεις των κηλίδων στην κάτω επιφάνεια των φύλλων εμφανίζεται λευκή, υπόλευκη ή καστανή επάνθηση, που αποτελείται από τις καρποφορίες του παθογόνου. Συνήθως η προσβολή αρχίζει από τα φύλλα της βάσης και επεκτείνεται προοδευτικά στα φύλλα της κορυφής. Αν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές η προσβολή προχωρά πολύ γρήγορα και

η ασθένεια μπορεί να καταστρέψει σε λίγες μέρες το φύλλωμα. Προσβάλλει όλα τα πράσινα μέρη του φυτού αλλά οι σοβαρότερες ζημιές γίνονται στο φύλλωμα και στα σταφύλια. Τα φύλλα μπορούν να προσβληθούν από τα στάδια της πράσινης κορυφής – έξοδος φύλλων μέχρι αργά το φθινόπωρο με μεγαλύτερη ευαισθησία όταν είναι νεαρά. Σοβαρές προσβολές προκαλούν πρόωρη αποφύλλωση. Σε έντονη αποφύλλωση η θρέψη του πρέμνου είναι ανεπαρκής με αποτέλεσμα τα σταφύλια να μην ωριμάζουν ομαλά και οι κληματίδες να μην ξυλοποιούνται κανονικά με συνέπειες στην παραγωγή και της επόμενης χρονιάς. Τα σταφύλια μπορούν να προσβληθούν από την εμφάνισή τους μέχρι το γυάλισμα με μεγαλύτερη ευαισθησία κατά τα βλαστικά στάδια: μούρο – άνθηση – καρπόδεση.

Το παθογόνο διατηρείται καθόλη τη διάρκεια του έτους στα υπολείμματα της καλλιέργειας. Τα μολύσματα του μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις με τη βοήθεια του ανέμου. Η ασθένεια ευνοείται από υψηλή υγρασία και χαμηλές σχετικά θερμοκρασίες.

Για την αντιμετώπιση της ασθένειας που προκαλεί ο παραπάνω μύκητας συνιστάται η λήψη των παρακάτω μέτρων:

1. Λήψη μέτρων που θα μειώσουν την υγρασία στον αγρό (αραιή φύτευση, καλή στράγγιση, καλός αερισμός, κανονικά ποτίσματα, κατάλληλα κλαδέματα, κλπ).
2. Καταστροφή των υπολειμμάτων της καλλιέργειας με βαθύ παράχωμα μετά το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου.
3. Εφαρμογή ψεκασμών με εγκεκριμένα για την καλλιέργεια της αμπέλου μυκητοκτόνα πριν και μετά την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων (προστατευτικά-θεραπευτικά).

Για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των προστατευτικών ψεκασμών και την αποφυγή άσκοπης χρήσης μυκητοκτόνων, συνιστάται οι ψεκασμοί για την αντιμετώπιση της ασθένειας στο αμπέλι να βασίζονται σε Συστήματα Γεωργικών Προειδοποιήσεων από τα κατά τόπους Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Όπου δεν υπάρχουν Συστήματα Γεωργικών Προειδοποιήσεων και ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες, οι ψεκασμοί θα πρέπει να αρχίζουν λίγο πριν από το στάδιο της άνθησης και να συνεχίζονται μέχρι και το στάδιο του “δεσίματος” των ραγών, για να προστατευτεί το φυτό την κρίσιμη αυτή περίοδο.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, με βάση τα περιβαλλοντικά δεδομένα που εξετάστηκαν από το ΜΦΙ, και ειδικότερα το ύψος και την κατανομή των βροχοπτώσεων, καθώς και τη μέση ημερήσια σχετική υγρασία, οι συνθήκες που επικράτησαν στις περιοχές του Παγγαίου κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές για την εμφάνιση και την εξέλιξη της ασθένειας. Η επικράτηση των συνθηκών αυτών ήταν ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι κατά την εν λόγω περίοδο τα αμπέλια βρίσκονταν σε ευαίσθητα φαινολογικά στάδια, όπως η άνθηση και η αρχή της καρπόδεσης. Παράλληλα, οι επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες δυσχέραιναν τη διενέργεια έγκαιρων και αποτελεσματικών ψεκασμών για την προληπτική ή/και θεραπευτική αντιμετώπιση της ασθένειας με εγκεκριμένες μυκητοκτόνες δραστικές ουσίες.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.

Ο Γενικός Διευθυντής

PANAGIOTIS MYLONAS
21/07/2026 14:44
Δρ Π. Μυλωνάς