



**ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ
ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ**

Επ. Διεύθυνση: α) Φυτοπαθολογίας
β) Εντομολογία & Γεωργική Ζωολογία
Εργαστήρια: α) Ιολογίας, β) Ακαρολογίας
& Γεωργικής Ζωολογίας
Πληροφορίες: Δρ Χρ. Βαρβέρη,
Δρ Ε. Καπαξίδη

Κηφισιά, 4/8/2026

Αρ. Πρωτ. 3086

Προς:

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων
Γραφείο Νομικών και
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων
Υπηρεσία Συντονισμού
Αχαρνών 2
Αθήνα 101 76

E-mail: koinovouleftikos@minagric.gr
ekarli@minagric.gr

Θέμα: Ερώτηση αρ. 7471/31.7.2026 της Βουλής των Ελλήνων.

Σχετ.: Ηλεκτρονικό σας μήνυμα από 3.8.2026.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού ηλεκτρονικού σας μηνύματος, που αφορά στο πρόβλημα των παραμορφωμένων καρπών στην καλλιέργεια της ροδακινιάς στις ΠΕ Πέλλας, Ημαθίας, Λάρισας και άλλες περιοχές της χώρας, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

1. Τα Εργαστήρια Ιολογίας και Ακαρολογίας & Γεωργικής Ζωολογίας του ΜΦΙ του ΜΦΙ παρακολουθούν την εξέλιξη του προβλήματος από την αρχή της εμφάνισής του με εντατικές δειγματοληψίες και αναλύσεις στο πλαίσιο υλοποίησης σχετικού ερευνητικού προγράμματος διάρκειας τεσσάρων (4) ετών που χρηματοδοτεί το ΥπΑΑΤ από 24/10/2024. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη διερεύνηση της ακριβούς αιτιολογίας της έντονης παραμόρφωσης των καρπών ροδακινιάς και στην παροχή στοχευμένων οδηγιών αντιμετώπισής της. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας, η παραμόρφωση των καρπών οφείλεται σε είδος ακάρεως του γένους *Eriophyes*, η ταυτότητα και επιδημιολογία του οποίου βρίσκεται υπό μελέτη. Οι σε βάθος μελέτες αυτού του τύπου συνήθως διαρκούν αρκετά έτη. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει συσχέτιση της παρουσίας ιών και ιοειδών με τα παραμορφωτικά συμπτώματα στους καρπούς των δένδρων όχι μόνο ροδακινιάς αλλά και βερικοκιάς.

Κατά την παρούσα καλλιεργητική περίοδο το σύμπτωμα της παραμόρφωσης των ροδάκινων σε συνδυασμό με την παρουσία του ακάρεως *Eriophyes* sp. καταγράφηκε από το εργαστήριο Ακαρολογίας και Γ. Ζωολογίας του ΜΦΙ στις ΠΕ Πέλλας (Δήμους

Πέλλας και Αλμωπίας), Φλώρινας (Δήμος Αμυνταίου), Τρικάλων (Δήμος Τρικκαίων) και Λάρισας (Δήμος Τυρνάβου) σε δείγματα που στάλθηκαν είτε από ιδιώτες είτε από τις αντίστοιχες υπηρεσίες (ΔΑΟΚ).

2. Ήδη από το φθινόπωρο του 2024 **προτάθηκαν από το ΜΦΙ οδηγίες αντιμετώπισης του ακάρεως που περιλαμβάνουν χημικές παρεμβάσεις και μέτρα υγιεινής των οπωρώνων**. Αν και φέτος η παρουσία του προβλήματος εξακολούθησε, υπήρξε σημαντική μείωση του ποσοστού παραμόρφωσης στους εξεταζόμενους αγρούς της ΠΕ Πέλλας. Σύμφωνα με τα δεδομένα των ετών 2024-2025 τα οποία ελήφθησαν από αγρούς των περιοχών Αμπελειών και Νέου Μυλότοπου της Π.Ε. Πέλλας (τα στοιχεία για το τρέχον έτος δεν έχουν συγκεντρωθεί ακόμα), που υπόκεινται σε συστηματικές δειγματοληψίες, εμφανίστηκε μείωση στο ποσοστό παραμόρφωσης η οποία κυμάνθηκε από 20% έως 90%. Αναμένεται περαιτέρω καλύτερευση της κατάστασης από την επόμενη χρονιά, εφόσον συνεχισθεί η καθολική και πιστή εφαρμογή από τους παραγωγούς των προταθέντων μέτρων αντιμετώπισης.

Τα υπόλοιπα θέματα που αναφέρονται στο ερώτημα προς τη Βουλή δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.

Ο Γενικός Διευθυντής

PANAGIOTIS MYLONAS
04/08/2026 18:37

Δρ Π. Μυλωνάς