



**ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ
ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ**

Επ. Διεύθυνση: Εντομολογίας & Γ.
Ζωολογίας
Εργαστήριο: Γεωργικής Εντομολογίας
Πληροφορίες: Δρ Σ. Αντωνάτος

Κηφισιά, 13/8/2026

Αρ. Πρωτ. 3237

Προς:
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων
Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών
Θεμάτων
Υπηρεσία Συντονισμού
Αχαρνών 2
Αθήνα 101 76
E-mail: koinovouleftikos@minagric.gr
ekarli@minagric.gr

Θέμα: Ερώτηση αρ. 7592/10.08.2026 της Βουλής των Ελλήνων.

Σχετ.: Το από 10.8.2026 ηλεκτρονικό σας μήνυμα

Σε απάντηση του ανωτέρου σχετικού ηλεκτρονικού σας μηνύματός σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Το έντομο *Capnodis tenebrionis* (Coleoptera: Buprestidae) (κν καπνώδης) είναι σοβαρός εχθρός πολλών δενδρωδών καλλιεργειών, κυρίως πυρηνοκάρπων και δευτερευόντως άλλων δέντρων όπως μηλιά, κυδωνιά, μουσμουλιά ή πολύ σπανιότερα φιστικιά και φουντουκιά. Συμπληρώνει μία γενεά το έτος και σε κάποιες περιοχές μία κάθε δύο έτη. Το θηλυκό αποθέτει τα αυγά του στο έδαφος κοντά στο λαιμό του δέντρου σε απόσταση από 0 έως 40 εκ. από αυτόν. Η νεαρή προνύμφη αμέσως μετά την εκκόλαψη βυθίζεται στο έδαφος για να φθάσει στη ρίζα ή στη βάση του κορμού όπου ορύσσει στοά. Η νύμφωση γίνεται σε θάλαμο που η προνύμφη κατασκευάζει στο ξύλο και στον φλοιό κοντά στο λαιμό του δέντρου. Η ζημιά από τις προνυμφικές στοές στο φλοιό και στο ξύλο του κορμού και των κεντρικών ριζών επιφέρει σχεδόν πάντα το θάνατο των δενδρυλλίων και νεαρών δέντρων σε περιοχές με ξηρό θέρος και φθινόπωρο. Σε ξερικούς ή ανεπαρκώς αρδευόμενους οπωρώνες μπορεί να ζημιωθούν σοβαρά και δέντρα μεγαλύτερης ηλικίας.

Η αντιμετώπισή του εντόμου είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω του τρόπου που δραστηριοποιείται η προνύμφη. Ικανοποιητικά αποτελέσματα στην αντιμετώπισή του έχει η

εφαρμογή των εντομοπαθογόνων νηματωδών του είδους *Steinernema carpocapsae*. Οι εντομοπαθογόνοι νηματώδεις κινούνται στο έδαφος, και εντοπίζουν τις προνύμφες τις οποίες θανατώνουν. Οι εντομοπαθογόνοι νηματώδεις είναι παράγοντες βιολογικής καταπολέμησης και η χρήση τους είναι ασφαλής για τον χρήστη και το περιβάλλον.

Στην αντιμετώπιση του εντόμου μπορεί ακόμα να συμβάλλουν:

- Εφαρμογή τακτικών λιπάνσεων, κλαδεμάτων και αρδεύσεων, για να διατηρούνται τα δέντρα ζωηρά. Το αυγό και η προνύμφη του εντόμου, δεν ευνοούνται από την εδαφική υγρασία, η οποία λειτουργεί αποτρεπτικά όσον αφορά την ωοτοκία των ενηλίκων, αλλά ταυτόχρονα μειώνει το ποσοστό επιβίωσης των αυγών.
- Κατά την περίοδο Μαΐου – Ιουνίου, συνιστάται η συλλογή και η θανάτωση των ενηλίκων του καπνώδη σε μικρούς οπωρώνες. Αυτή η εργασία καλό είναι να γίνεται κατά τις πρωινές ώρες, κατά τις οποίες αυτά βρίσκονται στην περιοχή του λαιμού των δένδρων κοντά στο έδαφος και πριν να μετακινηθούν στα υψηλότερα μέρη του δένδρου.
- Άμεση καταστροφή με φωτιά των ήδη ξερών δένδρων ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση του εντόμου.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.

Ο Γενικός Διευθυντής

PANAGIOTIS MYLONAS
13/08/2026 09:14

Δρ Π. Μυλωνάς