


21 ΙΑΝ. 2011



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 19.01.2011

Αρ. Πρωτ.: 144079
(σχετ.: 144043)

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2105230110, 2105237254
Fax : 2105237254
Πληροφορίες :
E-mail : tke@yyka.gov.gr

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερωτήσεις Βουλευτών

Απαντώντας στις με αρ. 6020/9-11-10 και 6063/10-11-10 ερωτήσεις, που κατατέθηκαν στη Βουλή από τους Βουλευτές κκ. Κ. Βελόπουλο, Α. Πλεύρη και Σ.-Α. Γεωργιάδη, σχετικά με την έξαρση της φυματίωσης, σας αποστέλλουμε την τελευταία έκθεση για τη φυματίωση που συνέταξε το Γραφείο Νοσημάτων που Μεταδίδονται μέσω του Αναπνευστικού, του Τμήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης.

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, μέσω του δηλούμενων κρουσμάτων φυματίωσης, η μέση επίπτωση της νόσου κατά την τελευταία πενταετία (2005-2009) ανέρχεται στα 5,97 κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμό.

Όσον αφορά στην κατανομή της νόσου κατά εθνικότητα, το 66% των κρουσμάτων είναι Έλληνες και το 30,7 αλλοδαποί, όπως φαίνεται λεπτομερώς και στην προαναφερόμενη έκθεση.

Συνημμένα: τέσσερα (4) φύλλα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτές κκ. Κ. Βελόπουλο, Α. Πλεύρη,
Σ.-Α. Γεωργιάδη

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

- 1.Γρ.Υπουργού
- 2.Γρ.Υφυπουργού
- 3.Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.

Μ.ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ



ΓΕΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ερηνή Πέτσι

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Γενικά

Η φυματίωση είναι μια από τις συχνότερες λοιμώδεις νόσους στον κόσμο. Προκαλείται από το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης (*Mycobacterium tuberculosis*), το οποίο συνηθέστερα προσβάλλει τους πνεύμονες. Μεταδίδεται από άτομο σε άτομο με σταγονίδια, τα οποία εκπέμπουν οι ασθενείς όταν βήχουν, φτερνίζονται ή ομιλούν.

Παρ' ότι υπάρχουν αποτελεσματικά φάρμακα για τη θεραπεία της, η φυματίωση προκαλεί πάνω από ένα εκατομμύριο θανάτους το χρόνο, κυρίως στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Παγκοσμίως σημειώνονται κάθε χρόνο περίπου 140 νέα κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμού.


Η παγκόσμια επιδημία της φυματίωσης σχετίζεται στενά με την επιδημία του HIV/AIDS, το οποίο αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο νόσου μετά από μόλυνση με το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης.

Ιδιαίτερο πρόβλημα αποτελούν οι πολυανθεκτικές μορφές φυματίωσης, που δεν ανταποκρίνονται στα συνήθη φάρμακα πρώτης γραμμής. Οι ασθενείς αυτοί θεραπεύονται δύσκολα και με μεγάλο κόστος.

Επιδημιολογικά στοιχεία


Η φυματίωση είναι υποχρεωτικώς δηλούμενο νόσημα στην Ελλάδα από το 1950. Με βάση τα δηλωθέντα κρούσματα, η επίπτωση της νόσου παρουσιάζει μικρή πτώση κατά την τελευταία δεκαετία και το 2009 έφτασε τα 4,9 κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμού (Γράφημα 1). Υπάρχουν ωστόσο ενδείξεις ότι το σύστημα επιτήρησης παρουσιάζει σημαντική υποδήλωση.

Γράφημα 1. Ετήσια επίπτωση φυματίωσης στην Ελλάδα, 2000-2009




Με βάση τα δεδομένα της τελευταίας πενταετίας (2005 – 2009), η νόσος είναι πιο συχνή στους άρρενες (αναλογία αρρένων:θηλέων = 2:1) (Γράφημα 2), ενώ δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερες διαφορές στη συχνότητα εμφάνισης της νόσου κατά γεωγραφική ζώνη (Γράφημα 3).

Γράφημα 2. Επίπτωση φυματίωσης κατά φύλο, Ελλάδα, 2005-2009




Γράφημα 3. Επίπτωση φυματίωσης κατά γεωγραφική ζώνη (NUTS I), 2005-2009




Για την ίδια πενταετία (2005-2009), η επίπτωση της νόσου είναι μεγαλύτερη στα άτομα άνω των 65 ετών (Γράφημα 4).

Γράφημα 4. Επίπτωση φυματίωσης κατά ηλικιακή ομάδα, Ελλάδα, 2005-2009



Το 66,0% των κρουσμάτων ήταν Έλληνες και το 30,7% ήταν αλλοδαποί (Γράφημα 5). Η ηλικιακή κατανομή των κρουσμάτων διέφερε σημαντικά μεταξύ των δύο ομάδων (Γράφημα 6). Οι Έλληνες είχαν μεγαλύτερη διάμεση ηλικία (53 έτη) απ' ότι οι αλλοδαποί (30 έτη).

Γράφημα 5. Σχετική συχνότητα κρουσμάτων φυματίωσης κατά εθνικότητα, Ελλάδα, 2005-2009



Γράφημα 6. Ηλικιακή κατανομή κρουσμάτων φυματίωσης κατά εθνικότητα, Ελλάδα, 2005-2009

