

- 1 ΙΟΥΝ. 2016



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα, Τηλ. 210-2124180 Fax : 210-2124524

Αθήνα 31-5-2016
Αριθμ. Πρωτ.: 589

✓ **Προς:**
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: «Ζημιές από μύκητες στα σιτηρά της Θεσσαλίας»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 5309/11-05-2016

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Π. Ηλιόπουλος και με βάση την από 16/05/2016 έγγραφη ενημέρωση από τον Πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α., κ. Θ. Κουρεμπέ, σας πληροφορούμε τα εξής:

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (ΠΚΠΦ&ΠΕ) Βόλου συμπεριλαμβάνει τις μυκητολογικές προσβολές των σιτηρών στα «Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων» που εκδίδονται για ενημέρωση και βοήθεια των παραγωγών. Για την τρέχουσα περίοδο, εξέδωσε τα με αρ. 1/4-3-2016, 2/4-4-2016 και 3/8-4-2016 συνημμένα τεχνικά δελτία για το Σιτάρι, στα οποία φαίνεται ότι επικρατέστερη μυκητολογική ασθένεια ήταν το ωίδιο, ενώ η σεπτορίωση εμφανίστηκε αρχές Απριλίου σε καλλιέργειες σιτηρών της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Λάρισας, όπου συνηθίζεται η μονοκαλλιέργεια σιτηρών. Στα εν λόγω δελτία αναφέρονται συστάσεις και υποδείξεις προς τους παραγωγούς, καθώς και εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Σημειώνεται ότι παρόμοιες διαπιστώσεις με αυτές των προαναφερόμενων δελτίων έχουν γίνει από το Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας του ΤΕΙ Λάρισας.

Όσον αφορά στην ασφαλιστική κάλυψη των ζημιών που παρατηρούνται σε καλλιέργειες από μυκητολογικές και εντομολογικές προσβολές, επισημαίνεται ότι τέτοιου είδους ζημιές δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α.

Ωστόσο, οι ζημιές από ασθένειες (σεπτορία, σκωρίαση) θα μπορούσαν να ενταχθούν σε προγράμματα χορήγησης Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ), αρμοδιότητας ΠΣΕΑ, εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων και οι Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τη γεωργία και την κτηνοτροφία.

Σημειώνεται ότι μία από τις βασικές προϋποθέσεις ένταξης σε πρόγραμμα ΚΟΕ είναι η μείωση παραγωγής των καλλιεργειών να φθάνει στο 30% σε επίπεδο Π.Ε. σε σχέση με τη μέση απόδοση των προηγούμενων τριών ετών, με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της χώρας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



Π. Ηλιόπουλος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτή κ. Π. Ηλιόπουλο

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ * ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΟΛΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Τορούτζια-Νικολαΐδη
Τ.Κ. 38334 Βόλος
Τηλέφωνο: 24210 66525
Fax: 24210 69545
e-mail: fyto12@otenet.gr
Πληροφορίες: Δρ. Φωτεινή Ανδρέογλου

Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων:
- βλάπτει την υγεία των καταναλωτών
- επιβαρύνει το περιβάλλον
- αυξάνει το κόστος παραγωγής

ΣΙΤΗΡΑ Ν° 2 / 4-4-2016


ΣΙΤΑΡΙ

Το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται εκτεταμένες προσβολές από το μύκητα του ωϊδίου (*Erysiphe graminis* f.sp. *tritici*) (εικόνα 1), οι οποίες κατά τόπους είναι ιδιαίτερα έντονες. Οι παραγωγοί θα πρέπει να επισκέπτονται και να παρατηρούν τα κτήματά τους, καθώς πολλές φορές οι φυτείες φαίνονται υγιείς, αν όμως κανείς παρατηρήσει τα φυτά από κοντά θα διαπιστώσει ότι είναι προσβεβλημένα (εικόνα 2).

Σε περίπτωση σοβαρής προσβολής συστήνεται ψεκασμός άμεσα με ένα εγκεκριμένο μυκητοκτόνο. Η απόφαση για ψεκασμό θα πρέπει πάντα να παίρνεται σε συνεργασία με τους κατά τόπους γεωπόνους, συνεκτιμώντας την κατάσταση των φυτειών, τις κλιματολογικές συνθήκες, το κόστος του ψεκασμού, αλλά και τον κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας από την επαναλαμβανόμενη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων της ίδιας ομάδας.

Εκτός από την Υπηρεσία μας, παρόμοιες παρατηρήσεις για προσβολές ωϊδίου έχουν αναφερθεί από τα Εργαστήρια Φυτοπαθολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του ΤΕΙ Λάρισας.





Φυτοπροστατευτικά προϊόντα: *azoxystrobin, cyproconazole, fenpropimorph, picoxystrobin, prochloraz, propiconazole, prothioconazole, pyraclostrobin, sulphur, tebuconazole, triadimenol, trifloxystrobin.*

- Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες χρήσεως των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
- Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων στο διαδίκτυο www.minagric.gr
- Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται να λαμβάνουν τις γεωργικές προειδοποιήσεις για τα σιτηρά, παρακαλούνται να το δηλώσουν με ηλεκτρονικό μήνυμα προς την Υπηρεσία μας, στη διεύθυνση: fyto12@otenet.gr

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος α.α.

Δρ. Λύκας Δημήτριος

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ * ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΟΛΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Τορούτζια-Νικολαΐδη
Τ.Κ. 38334 Βόλος
Τηλέφωνο: 24210 66525
Fax: 24210 69545
e-mail: fyto12@otenet.gr
Πληροφορίες: Δρ. Φωτεινή Ανδρέογλου

Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων:
- βλάπτει την υγεία των καταναλωτών
- επιβαρύνει το περιβάλλον
- αυξάνει το κόστος παραγωγής

ΣΙΤΗΡΑ Ν° 3 / 8-4-2016

ΣΙΤΑΡΙ

Το τελευταίο δεκαήμερο διαπιστώνονται μεικτές μολύνσεις Ωΐδιο (*Erysiphe graminis* f.sp. *tritici*), Πυρηνοφόρα (*Pyrenophora tritici-repentis*) και Σεπτορίωση (*Septoria* spp.) σε αρκετά σιταροχώραφα του νομού Λάρισας, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις έχουν φτάσει στο φύλλο σημαία. Οι προσβολές είναι πιο σοβαρές σε περιοχές όπου συνηθίζεται η μονοκαλλιέργεια σιτηρών. Παρόμοιες διαπιστώσεις έχουν γίνει από το Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας του ΤΕΙ Λάρισας.

Επειδή το επόμενο χρονικό διάστημα με τις επικείμενες βροχοπτώσεις κρίνεται επικίνδυνο για την εξάπλωση των προσβολών, συστήνεται άμεσα ψεκασμός με ένα εγκεκριμένο μυκητοκτόνο, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που δεν έχει διενεργηθεί πρόσφατη επέμβαση. Η απόφαση για ψεκασμό θα πρέπει να παίρνεται πάντα σε συνεργασία με τους κατά τόπους γεωπόνους.

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα: azoxystrobin, cyproconazole, fenpropimorph, picoxystrobin, prochloraz, propiconazole, prothioconazole, pyraclostrobin, sulphur, tebuconazole, triadimenol, trifloxystrobin.

- Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες χρήσεως των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
- Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων στο διαδίκτυο www.minagric.gr
- Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται να λαμβάνουν τις γεωργικές προειδοποιήσεις για τα σιτηρά, παρακαλούνται να το δηλώσουν με ηλεκτρονικό μήνυμα προς την Υπηρεσία μας, στη διεύθυνση: fyto12@otenet.gr

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος α.α.

Δρ. Λύκας Δημήτριος

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ * ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΟΛΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Τορούτζια-Νικολαΐδη
Τ.Κ. 38334 Βόλος
Τηλέφωνο: 24210 66525
Fax: 24210 69545
e-mail: fyto12@otenet.gr
Πληροφορίες: Δρ. Φωτεινή Ανδρέογλου

Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων:
- βλάπτει την υγεία των καταναλωτών
- επιβαρύνει το περιβάλλον
- αυξάνει το κόστος παραγωγής

ΣΙΤΗΡΑ Ν° 1 / 4-3-2016

ΣΙΤΑΡΙ

Από επιτόπους ελέγχους σε καλλιέργειες σιταριού στους νομούς Μαγνησίας και Λάρισας, αλλά και από εξετάσεις δειγμάτων που έχουν προσκομισθεί στην Υπηρεσία μας, έχουν διαπιστωθεί προσβολές από ωΐδιο (*Erysiphe graminis* f.sp. *tritici*), οι οποίες κατά τόπους είναι έντονες. Παρόμοιες παρατηρήσεις έχουν αναφερθεί από τα Εργαστήρια Φυτοπαθολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του ΤΕΙ Λάρισας.

Τα συμπτώματα της προσβολής είναι ο σχηματισμός λευκών έως γκριζόλευκων επανθήσεων στην άνω επιφάνεια των κατώτερων αρχικά φύλλων (εικόνα 1). Οι επανθήσεις αυτές εμφανίζονται μεμονωμένα κατά θέσεις, ενώ αργότερα συνενώνονται και καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος της φυλλικής επιφάνειας. Σε έντονες προσβολές οι ιστοί αποξηραίνονται.



Εικ. 1. Λευκές επανθήσεις ωΐδιου σε φύλλο σιταριού.

Η άριστη θερμοκρασία ανάπτυξης της ασθένειας είναι 15-22 °C, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι τα κονίδια (σπόρια) του μύκητα μπορούν να βλαστήσουν σε εύρος 1-30 °C, χωρίς την παρουσία ελεύθερης υγρασίας.

Οι παραγωγοί θα πρέπει να επισκέπτονται και να παρατηρούν τα κτήματά τους. Σε περίπτωση έντονης προσβολής συστήνεται άμεσα ψεκασμός με ένα εγκεκριμένο μυκητοκτόνο. Η απόφαση για ψεκασμό θα πρέπει να παίρνεται πάντα σε συνεργασία με τους κατά τόπους γεωπόνους.

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα: *azoxystrobin, cyproconazole, fenpropimorph, picoxystrobin, prochloraz, propiconazole, prothioconazole, pyraclostrobin, sulphur, tebuconazole, triadimenol, trifloxystrobin*

- Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες χρήσεως των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
- Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων στο διαδίκτυο www.minagric.gr
- Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται να λαμβάνουν τις γεωργικές προειδοποιήσεις για τα σιτηρά, παρακαλούνται να το δηλώσουν με ηλεκτρονικό μήνυμα προς την Υπηρεσία μας, στη διεύθυνση: fyto12@otenet.gr

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος α.α.

Δρ. Λύκας Δημήτριος