



Κ.Ο. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ

ΧΑΡΑ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΒ

1764

21/4/17

Αθήνα, Μ. Τρίτη 11 Απριλίου 2017

Αναφορά

Προς τους Υπουργούς:

- Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευαγγ. Αποστόλου
- Εσωτερικών κ. Παναγ. Σκουρλέτη
- Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γ. Σταθάκης

Θέμα: «Προσβολές του λεπιδόπτερου *Lymantria dispar* σε βοσκότοπους της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας»

Σας υποβάλλω έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης σχετικά με τις έντονες προσβολές από το λεπιδόπτερο *Lymantria dispar* (λυμάντρια) στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.

Το εν λόγω έντομο προκαλεί έντονη αποφύλλωση των πουρναριών που είναι το δασικό είδος που επικρατεί στην περιοχή. Επίσης, έχουν καταγραφεί προσβολές σε κηπευτικά στους κήπους των οικιών (τομάτες, φράουλες κλπ), σε καλλωπιστικά φυτά (τριανταφυλλιές κλπ), σε δέντρα (ροδιές, ελιές κλπ). Σε περίπτωση έξαρσης πληθυσμών, όπου η παρουσία των προνυμφών στις οικίες προκαλεί ιδιαίτερη όχληση με την παρουσία τους, υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης αλλεργικών αντιδράσεων σε ευαίσθητα άτομα.

Τέλος, σε συνεργασία με την ΔΑΟΚ το Εργαστήριο Δασικής Εντομολογίας του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης ζήτησε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος την εκκίνηση της διαδικασίας παρακολούθησης των πληθυσμών του εντόμου αυτού προκειμένου να γίνεται πρόβλεψη της εμφάνισής του και την οργάνωση ενεργειών για την καταπολέμησή του.

Παρακαλώ όπως επιληφθείτε του ζητήματος και μας ενημερώσετε για τις ενέργειές σας.

Η Αναφέρουσα Βουλευτής

Χαρά Κεφαλίδου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. δ/ση: Διοικητήριο, 661 00 ΔΡΑΜΑ

Πληροφ.: Ι. Σαρίγκολη, Κ. Σίμογλου

Τηλ.: 25213 51244, -247

Φαξ: 25213 51204

Ηλ. δ/ση: simoglouk@pamth.gov.gr

Δράμα, 11-04-2017

Αρ. πρωτ.: 6647

ΠΡΟΣ: Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Δράμας
ΕΝΤΑΥΘΑ

ΘΕΜΑ: Προσβολές του λεπιδοπτέρου *Lymantria dispar* σε βοσκοτόπους της Π.Ε. Δράμας.

Σάς ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας ενημερώθηκε από αιγοτρόφους της περιοχής Κυργίων ότι παρατηρήθηκαν έντονες προσβολές από το λεπιδόπτερο *Lymantria dispar* (λυμάντριά) σε πουνάρια.

Το εν λόγω έντομο προκαλεί έντονη αποφύλλωση των πουνარიών, που είναι το δασικό είδος που επικρατεί στην περιοχή. Κατά την άνοιξη του έτους 2016 παρατηρήθηκε σοβαρή έξαρση των πληθυσμών του εντόμου σε πολλές περιοχές της Π.Ε. Δράμας. Σε συνεργασία με τον ερευνητή Δρ. Δημήτριο Αβτζή, γεωπόνοι της Υπηρεσίας μας είχαν επισκεφτεί πολλές περιοχές και κατέγραψαν τις εκτεταμένες προσβολές. Παρατηρήθηκε επίσης σοβαρή όχληση σε κατοίκους των οποίων οι οικίες βρίσκονταν σε άμεση εγγύτητα προς τη δασική βλάστηση. Ο εν λόγω ερευνητής μετά από πρόσκληση της ΔΑΟΚ Δράμας παραβρέθηκε και παρουσίασε το συγκεκριμένο θέμα στην Ημερίδα Εντομολογίας στις 03-03-2017 στο Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας, όπου παραβρέθηκαν και εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων.

Το πουνάρι είναι ο πιο σημαντικός ξενιστής του εντόμου, ωστόσο πρόκειται για είδος εξαιρετικά πολυφάγο. Έχει παγκόσμια εξάπλωση και στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι προσβάλλει περισσότερα από 600 είδη φυτών. Από την επισκόπηση στο Μοναστηράκι καταγράφηκαν προσβολές σε κηπευτικά στους κήπους των οικιών (τομάτες, φράουλες κλπ.), σε καλλωπιστικά φυτά (τριανταφυλλίες, χρυσάνθεμα), σε δένδρα (ροδιές, ελιές, μελικοκκίες). Το *L. dispar* εμφανίζει περιοδικότητα στις εξάρσεις των πληθυσμών του, με συνηθέστερη την καταγραφή τους κάθε 7-9 έτη.

Το έντομο έχει μία γενεά ανά έτος. Οι προνύμφες του εμφανίζονται την άνοιξη και η παρουσία τους είναι εμφανής συνήθως έως τον Ιούνιο. Η προνυμφική ανάπτυξη ολοκληρώνεται σε 5-6 στάδια (ανάλογα με το γένος των ενηλίκων που θα προκύψουν). Στην προκειμένη περίπτωση παρατηρήθηκαν κατά κύριο λόγο προνύμφες 5ου σταδίου, με ένα μικρό ποσοστό παρουσίας προνυμφών 4ου σταδίου. Ως προς τη διατροφική τους δραστηριότητα, οι προνύμφες είναι αρχικώς ημερόβιες, ωστόσο καθώς η ηλικία τους αυξάνει τρέπονται σε νυκτόβιες. Μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξής τους μεταβαίνουν σε προστατευμένα σημεία (κορμοί δένδρων) προκειμένου να νυμφωθούν. Η έξοδος των ενηλίκων συμβαίνει από τον Ιούνιο-Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο. Τα αβγά που τοποθετούν στους ξενιστές τους παραμένουν στα σημεία απόθεσης χωρίς να εκκολαφθούν μέχρι την επόμενη άνοιξη.

Στις περιπτώσεις έξαρσης πληθυσμών όπου η παρουσία των προνυμφών στις οικίες προκαλεί ιδιαίτερη όχληση με την παρουσία τους, υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης αλλεργικών αντιδράσεων σε ευαίσθητα άτομα. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως έντομο υγειονομικής σημασίας και να εξετάζεται η δυνατότητα εφαρμογής εγκεκριμένων βιοκτόνων σκευασμάτων (εντομοκτόνων υγειονομικής σημασίας) (π.χ. α-cypermethrin, λ-cyhalothrin κλπ.) με ψεκασμό των εξωτερικών επιφανειών των οικιών (ακολουθώντας τις οδηγίες της ετικέτας). Περισσότερες πληροφορίες ως προς τα εγκεκριμένα σκευάσματα βιοκτόνων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ (www.minagric.gr/syspest).

Σε συνεργασία με την ΔΑΟΚ Δράμας, το Εργαστήριο Δασικής Εντομολογίας του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης ζήτησε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος την εκκίνηση διαδικασίας παρακολούθησης των πληθυσμών του εντόμου αυτού προκειμένου να γίνεται πρόβλεψη της εμφάνισής του και την οργάνωση ενεργειών για την καταπολέμησή του.

Γεωπόνοι της Υπηρεσίας μας θα μεταβούν άμεσα στις περιοχές που φαίνεται ότι έχουν πληγεί για εκτίμηση της εξέλιξης του φαινομένου. Θα ενημερωθείτε άμεσα σχετικά μετά την αυτοψία των γεωπόνων.

ΜΕ Ε.Π.
Ο ΑΝΑΓΓΕΛΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΒΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ