




ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ



Ηλίας Μόσιαλος - Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ Επικρατείας  
Φραγκίσκος Παρασύρης - Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ Ν. Ηρακλείου

Αθήνα 25/10/2010

## ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς

Τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  
Κα Ανδρέα Λοβέρδο

Την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,  
Κα Άννα Διαμαντοπούλου

### Θέμα: «Το κάπνισμα σημαντική απειλή για τα παιδιά»

Στην Ελλάδα οι βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος αποτελούν μια από τις κυριότερες απειλές για την υγεία του πληθυσμού<sup>1</sup>. Σύμφωνα με στοιχεία που παρατίθενται σε έρευνα του καθηγητή Αντ. Καφάτου, υπολογίζεται ότι η Ελλάδα ανήκει στις χώρες της Ε.Ε με την μεγαλύτερη διάδοση του καπνίσματος καθώς το 40% του ενήλικου πληθυσμού δηλώνουν σήμερα καπνιστές<sup>2</sup>.

Ιδιαίτερη απειλή λόγω του καπνίσματος αντιμετωπίζουν και οι έφηβοι στη χώρα μας. Σύμφωνα με έρευνες για την χρήση του καπνού, η διάδοση του καπνίσματος σε μαθητές του λυκείου κυμαίνεται από 10-20% στην ηλικία των 15 ετών, ενώ αγγίζει το 50% στην ηλικία των 16-19 ετών. Η διάδοση του καπνίσματος για τους φοιτητές της ιατρικής σχολής κυμαίνεται στο 28-30%, ενώ για τους φοιτητές των υπολοίπων πανεπιστημιακών σχολών στο 42-44%<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Vardavas C., Kafatos A. : **Greece's smoking policy: another myth?** *The Lancet* 2006, 367(9521):1485-1486.

<sup>2</sup>Vardavas C., Athanasopoulos D., Balomenaki E., Niaounaki D., Linardakis M., Kafatos A. : **Smoking habits of Greek preschool children's parents**, Bio Med Central, 14 June 2007.

<sup>3</sup> Vardavas C., Kafatos A : **Tobacco policy and smoking prevalence in Greece**, *European Journal of Public Health* 2006.

Σύμφωνα με ευρήματα της παγκόσμιας έρευνας για το κάπνισμα στους νέους (Global Youth Tobacco Survey) στις ηλικίες 13-15 ετών, στην Ελλάδα 1 στους 4 καπνιστές ξεκίνησαν να καπνίζουν πριν την ηλικία των 10<sup>4</sup>.

Οι λόγοι της ιδιαίτερα μεγάλης διάδοσης του καπνίσματος σε νεαρές ηλικίες αν και ποικίλουν, εντοπίζονται κυρίως στην έλλειψη αντί-καπνιστικής παιδείας εντός του σχολείου, στην μη αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας που απαγορεύει την πώληση προϊόντων καπνού σε ανήλικους, στη σχετικά χαμηλή τιμή πώλησης των τσιγάρων συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες μέλη της Ε.Ε, στην έντονη διαφημιστική εκστρατεία των καπνοβιομηχανιών, αλλά κυρίως στην έκθεση των ανηλίκων τόσο σε αρνητικά πρότυπα όσο και σε περιβάλλον καπνού.

Ειδικότερα, η έκθεση των παιδιών στις αρνητικές συνήθειες των γονιών, όπως είναι το κάπνισμα, μπορεί να προκαλέσει σε αυτά την λανθασμένη εντύπωση ότι το κάπνισμα αποτελεί φυσιολογική συμπεριφορά των ενηλίκων. Από τη στιγμή που τα παιδιά επηρεάζονται και μαθαίνουν από την συμπεριφορά των γονιών, οι καπνιστές γονείς δεν παρέχουν μόνο εύκολη πρόσβαση στον καπνό, αλλά δρουν επίσης σαν βασικά πρότυπα για την αποδοχή και υιοθέτηση του καπνίσματος από τα παιδιά.

'Όμως οι καπνιστές γονείς εκτός του αρνητικού προτύπου που αποτελούν, εκθέτουν επίσης τα παιδιά τους σε ένα επιβλαβές περιβάλλον καπνού καθιστώντας τα παθητικούς καπνιστές. Πολυάριθμες μελέτες σχετικά με την έκθεση των παιδιών σε περιβάλλον καπνού καταδεικνύουν ότι μπορεί να οδηγήσει στην πρόκληση σοβαρών προβλημάτων υγείας, όπως καρδιαγγειακές παθήσεις, αναπνευστικά προβλήματα, άσθμα, νευρολογικές διαταραχές, προβλήματα νοητικής ανάπτυξης ακόμα και προδιάθεση σε μορφές καρκίνου<sup>5</sup>.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε στις 30.01.2007 την Πράσινη Βίβλο «Για μια Ευρώπη απαλλαγμένη από το κάπνισμα: στρατηγικές επιλογές σε επίπεδο Ε.Ε»<sup>6</sup> καθώς και την υπογραφή και κύρωση με νόμο της Σύμβασης Πλαισίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (W.H.O) για την καταπολέμηση του καπνίσματος<sup>7</sup>, ερωτώνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί:

<sup>4</sup> Kyrtesi A, Soteriades E, Warren C, Kremastinou J, Papastergiou P, Jones N, Hadjichristodoulou C: **Tobacco use among students aged 13–15 years in Greece: the Global Youth Tobacco Survey project.** *Bio Med Central, Public Health* 2007, 7:3..

<sup>5</sup> Rapiti E, Jindal SK, Gupta D, Boffetta P: **Passive smoking and lung cancer in Chandigarh, India.** *Lung Cancer.* 1999, 23:183-9.

Chan-Yeung M, Dimich-Ward H: **Respiratory health effects of exposure to environmental tobacco smoke.** *Respirology* 2003, 8:131-139.

<sup>6</sup> <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:263E:0447:0452:EL:PDF>

<sup>7</sup> Νόμος 3420/2005 « Κύρωση της Σύμβασης-Πλαισίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον έλεγχο του καπνού.

Ποια συντονισμένα μέτρα λαμβάνουν ή προτίθενται να λάβουν το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων προκειμένου να αποθαρρύνουν έφηβους και νέους από την κατανάλωση καπνού; Ποιοι τρόποι βοήθειας προσφέρονται σε όσους προτίθενται να κόψουν το κάπνισμα και πώς προστατεύονται οι παθητικοί καπνιστές που στη πλειοψηφία τους είναι παιδιά;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Ηλίας Μόσιαλος

Φραγκίσκος Γ. Παρασύρης

Βουλευτής Επικρατείας

Βουλευτής Ν. Ηρακλείου