





**ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ**



ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

-Υγείας

-Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

-Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Θέμα: «Αντιμετώπιση του κοινωνικού προβλήματος της κατανάλωσης αλκοόλ από τους εφήβους στη χώρα μας».

Τα κρούσματα του εθισμού των εφήβων στο αλκοόλ καταγράφονται αυξανόμενα στη χώρα μας, καθώς μεγάλος είναι ο αριθμός των εφήβων που κάθε χρόνο αντιμετωπίζει πρόβλημα με το αλκοόλ.

Η τελευταία Πανελλήνια Έρευνα του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής αναφορικά με τη χρήση του αλκοόλ από τους εφήβους που πραγματοποιήθηκε το έτος 2010 (η έρευνα πραγματοποιείται κάθε 4 χρόνια) αναφέρει ενδεικτικά ευρήματα.

Ειδικότερα, αναφέρεται ότι 1 στους 3 εφήβους ηλικίας 15 ετών καταναλώνει κάποιο οινοπνευματώδες ποτό τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και ότι η χρήση αλκοόλ στην Ελλάδα καταγράφεται σε υψηλότερα ποσοστά στα αγόρια απ' ό,τι στα κορίτσια, ιδιαίτερα όσο αυξάνεται η συχνότητα και η ποσότητα που καταναλώνεται.

Επίσης, 2 στους 5 εφήβους (43%) και 1 στις 3 εφήβους (33,1%) ηλικίας 15 ετών έχουν πει κάποιο οινοπνευματώδες ποτό τουλάχιστον 3 φορές εντός 1 μηνός, 1 στους 4 εφήβους (26,3%) και 1 στις 5 εφήβους (19,6%) ηλικίας 15 ετών πίνουν τουλάχιστον 3 οινοπνευματώδη ποτά σε μια συνηθισμένη τους έξοδο.

Αναφέρεται δε ότι η συχνότητα κατανάλωσης αυξάνεται σημαντικά σε αντιστοιχία με την ηλικία: τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα πίνουν το 2,8% των 11χρονων, το 11,2% των 13χρονων και το 35,3% των 15χρονων.

Επισημαίνεται, ακόμη ότι η Ελλάδα σε σύγκριση με τις άλλες χώρες εμφανίζει παρόμοιο ποσοστό με τον μέσο όρο των χωρών στους 11χρονους (3%), το 7^ο υψηλότερο ποσοστό στου 13χρονους (13%) και το 2^ο υψηλότερο στους 15χρονους (39%). Επίσης, αναφέρεται ότι στη χώρα μας οι μαθητές δοκιμάζουν αλκοολούχα ποτά από μικρή ηλικία και μάλιστα πίνουν συχνά σε υψηλότερα ποσοστά από τον μέσο όρο των συνομηλίκων τους στις άλλες χώρες.

Να σημειωθεί ότι η κατανάλωση αλκοόλ θεωρείται ότι εμφανίζει αιτιολογική σχέση με 60 τύπους διαταραχών και σωματικών κακώσεων. Εκτιμάται δε ότι προκαλεί το 20 - 30% των καρκίνων του οισοφάγου και του ήπατος, των κίρρωσεων του ήπατος, των φόνων, των επιληπτικών κρίσεων και των τροχαίων ατυχημάτων παγκοσμίως.

Σύμφωνα δε με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η θνησιμότητα, που οφείλεται στο αλκοόλ, εκτιμάται ότι ανέρχεται παγκοσμίως στους 1,8 εκατ. θανάτους, που αντιπροσωπεύουν το 3,2% της παγκόσμιας θνησιμότητας.

Την ίδια στιγμή, η εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας (Ν.3730/2008) στη χώρα μας παραμένει ελλιπής, με αποτέλεσμα η κατάσταση να επιδεινώνεται διαρκώς, ενώ ελλιπής καταγράφεται και η κρατική μέριμνα και στήριξη αναφορικά με τις εξειδικευμένες μονάδες απεξάρτησης από τον αλκοολισμό.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

- 1. Ποια μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης προτίθενται να λάβουν, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο του πρόωρου ηλικιακά εθισμού στο αλκοόλ, που τείνει να αποτελέσει μάστιγα για τους νέους στη χώρα μας; Ποια τα προγράμματα πρόληψης και θεραπείας που εκπονούνται από τα συναρμόδια υπουργεία;**
- 2. Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία, σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν αναφορικά με τον σχεδιασμό διαρθρωτικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων χρήσης του αλκοόλ στους εφήβους και αναφορικά με την αξιολόγησή τους σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο;**
- 3. Ποιες ενημερωτικές καμπάνιες δρομολογούνται από το υπουργείο Παιδείας σχετικά με τις διαστάσεις του εν λόγω κοινωνικού προβλήματος και τις επιβλαβείς του συνέπειες στους εφήβους;**
- 4. Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν, ώστε να εφαρμόζεται η σχετική νομοθεσία (αυστηροποίηση ελέγχων σε κέντρα διασκέδασης και σε μεμονωμένα σημεία πώλησης των αλκοολούχων ποτών);**

Οι ερωτώντες βουλευτές

Αναγνωστάκης Δημήτρης

Μάρκου Κατερίνα

Ρεπούση Μαρία